

## BOLLETTINO OLIVO del 13-02-2017

### FASE FENOLOGICA

Riposo vegetativo

### INTERVENTI COLTURALI

Si raccomanda di **attendere il mese di marzo prima di effettuare le operazioni di potatura** per non esporre le piante ai danni del gelo invernale. Il periodo ottimale per effettuare le operazioni di potatura è fine inverno inizio primavera (mesi di marzo e aprile ) quando il rischio di incorrere in danni da gelo è basso. Potare le piante prima dell'inverno, infatti induce nelle piante una ripresa vegetativa che le rende molto più suscettibili a subire forti danni in caso di temperature inferiori allo zero.

Si consiglia di non effettuare alcun tipo di concimazione azotata in questo periodo.

### TRATTAMENTI FITOSANITARI

#### OCCHIO DI PAVONE E ALTRI FUNGHI

Le osservazioni in campo dei nostri tecnici mostrano, nonostante il miglioramento delle condizioni ambientali, ancora importanti attacchi di **Cicloconio** (Occhio di Pavone *Cycloconium oleaginum*) a carico delle foglie in particolare nel caso di cultivar sensibili come la *Casaliva* e il *Frantoio*. Si evidenzia una maggiore incidenza degli attacchi a carico delle foglie laddove non sono stati effettuati i trattamenti preventivi a base di rame, dove non vengono effettuate annualmente le potature e laddove i sestri d'impianto sono eccessivamente fitti.



**Figura 1: Foglia con sintomi evidenti di Occhio di Pavone (*Cycloconium oleaginum*).**



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia  
Regg. UE 611-615/2014

I nostri tecnici hanno registrato anche attacchi di Antracnosi o Lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides*) in areali dove l'eccessiva densità o l'assenza di potatura non permette un'efficace circolazione d'aria.

In generale, le strategie di lotta consigliate contro queste tipologie di patogeni sono basate sulle **corrette pratiche agronomiche**, in particolare effettuare correttamente e tutti gli anni le potature (nei mesi di marzo e aprile) favorendo l'arieggiamento e l'illuminazione delle chiome e **sul ricorso ad interventi fitosanitari preventivi con prodotti cuprici utili anche per controllare lo sviluppo della Rogna dell'Olivo**. Per quanto riguarda il contenimento della Lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides*) si consiglia di aggiungere zolfo bagnabile al prodotto rameico distribuito. Si raccomanda di verificare la compatibilità dei due prodotti prima della miscelazione.

**Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.**

Per ogni dubbio o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a [info@aipol.bs.it](mailto:info@aipol.bs.it) o telefonando allo 0365/651391.