



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia Regg. UE 611-615/2014

BOLLETTINO OLIVO del 27-05-2016

FASE FENOLOGICA

Fine Mignolatura/Inizio Fioritura



Figura 1: Inizio fioritura su cv *Casaliva*.

Siamo ormai prossimi alla fioritura in tutti gli areali lombardi. E' già iniziata in Alto Garda e nelle zone più esposte della Valtenesi. Sul Sebino e sul Lario, invece, tolto in alcune zone, ci vorrà ancora qualche giorno affinché avvenga la schiusura completa dei fiori.

Quest'anno si è riscontrata un'ottima differenziazione a fiore e grazie alle piogge delle ultime due settimane siamo per ora in condizioni favorevoli anche dal punto di vista dell'allegagione.

INTERVENTI COLTURALI

POTATURA

Sospendere le operazioni di potatura in questa fase fenologica.

CONCIMAZIONE AZOTATA DI PRODUZIONE

Per le indicazioni relative alla concimazione azotata di produzione si rimanda a quanto riportato all'interno del precedente bollettino Aipol del 01/04/2016.



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO

Si raccomanda di non effettuare le concimazioni fogliari con Boro nel corso delle fioriture per non rischiare di compromettere questa importante e delicata fase fenologica determinante ai fini della produttività dell'oliveto. In caso di presenza di sintomi di Borocarenza (per la descrizione dei sintomi si rimanda al bollettino precedente), si consiglia di rimandare la concimazione fogliare terminata la fioritura, alla caduta completa dei petali, nel corso della fase fenologica dell'allegagione. **Ricordiamo che esistono formulazioni di Boro impieghabili anche in agricoltura biologica.**

TRATTAMENTI FITOSANITARI

COCCINIGLIE e MARGARONIA

In alcuni oliveti della Lombardia è stata evidenziata la presenza di infestazioni di cocciniglia cotonosa dell'olivo (*Lichtensia viburni*), di cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) e di margaronia (*Palpita unionalis*). Tuttavia in questa fase fenologica si consiglia di sospendere qualsiasi trattamento e di riprendere indicativamente a luglio, nel caso della cocciniglia, trattando con olio bianco alla fuoriuscita delle neanidi dallo scudetto materno, mentre nel caso della margaronia è consigliato riprendere con i trattamenti nel mese di agosto/settembre solo in oliveti giovani e in caso di sintomi conclamati. Per informazioni riguardo il trattamento contro la margaronia si raccomanda di contattare il tecnico di zona.

ANTRACNOSI, CICLOCONIO E CERCOSPORIOSI

Si consiglia di sospendere qualsiasi trattamento contro il cicloconio (Occhio di pavone), la cercosporiosi (piombatura) e l'antracnosi (Lebbra), in questa fase fenologica.

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.

Per ogni dubbio o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o telefonando allo 0365/651391.