



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia Regg. UE 611-615/2014

BOLLETTINO OLIVO del 12-06-2017

FASE FENOLOGICA

Fine fioritura / Allegagione



Figura 1: Allegagione.

La fioritura è pressoché terminata in tutti gli areali. Nella zona del Garda e negli areali più caldi risultano ormai visibili i primi frutti allegati.

INTERVENTI COLTURALI

CONCIMAZIONE AZOTATA DI PRODUZIONE

Per le indicazioni relative alla concimazione azotata di produzione si veda il bollettino del 21/04/2017.

CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO

In caso di presenza di sintomi di Borocarenza (per la descrizione dei sintomi si rimanda al bollettino precedente), è possibile effettuare la concimazione fogliare solamente in caso di fase fenologica di post fioritura – inizio allegagione.

Distribuire la sospensione a tutta chioma avendo cura di bagnare bene la pagina inferiore delle foglie e intervenire nelle ore più fresche della giornata. Si raccomanda di rispettare le dosi d'impiego riportate in etichetta e di miscelare la sospensione fogliare con altri prodotti solo se consentito. **Ricordiamo che esistono formulazioni di Boro impiegabili anche in agricoltura biologica.**



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

GESTIONE DEL TERRENO

Si raccomanda di effettuare con regolarità, gli sfalci degli oliveti con inerbimento permanente, in modo da controllare agevolmente le infestanti e da ridurre al minimo l'evapotraspirazione delle stesse. Ricordiamo infatti che l'acqua evapotraspirata dal manto erboso sottostante la chioma può provocare un'umidità relativa molto elevata andando a favorire lo sviluppo di funghi quali Antracnosi, Cicloconio, Piombatura, etc.

TRATTAMENTI FITOSANITARI

Sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario in fase di fioritura.

In caso di forti defogliazioni primaverili valutare un intervento in post fioritura con prodotti sistemici, citotropici o translaminari eradicanti in particolar modo nei confronti di Occhio di Pavone. Consigliamo di effettuare simili trattamenti solamente nei casi di accertata presenza del patogeno valutati dal tecnico di zona.

Negli oliveti a conduzione **biologica** si consiglia di effettuare un trattamento con zolfo bagnabile atto a contenere *Colletotrichum gloeosporioides* (Lebbra o Antracnosi).

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.

Per ogni dubbio o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o telefonando allo 0365/651391.