



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

BOLLETTINO OLIVO del 15-06-2020

TROVATE IL RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI COLTURALI DA SVOLGERE A FONDO DEL PRESENTE BOLLETTINO

FASE FENOLOGICA

Fine fioritura - Allegagione

Si segnala una fioritura abbondante in praticamente tutti gli areali. L'allegagione risulta variabile in relazione alla varietà considerata ed alla zona olivicola regionale. In alcune zone, dove le condizioni climatiche nella fase di fioritura ed impollinazione si sono mostrate ottimali, l'allegagione si è verificata in percentuali elevate. Ricordiamo che parte delle olive allegate saranno soggette a cascola post allegagione.



Figure 1_Olivo in fase di allegagione

INTERVENTI COLTURALI

GESTIONE DEL TERRENO

Si raccomanda di effettuare con regolarità, gli sfalci degli oliveti con inerbimento permanente, in modo da controllare agevolmente le infestanti e da ridurre al minimo l'evapotraspirazione delle stesse. Ricordiamo infatti che l'acqua evapotraspirata dal manto erboso sottostante la chioma può provocare un'umidità relativa molto elevata andando a favorire lo sviluppo di funghi quali Antracnosi, Cicloconio, Piombatura, etc.

CONCIMAZIONE AZOTATA

Negli oliveti specializzati è possibile effettuare l'ultima frazione di concimazione azotata a rapida cessione.

CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO

In caso di accertata presenza di Borocarenza è possibile effettuare la concimazione fogliare con il suddetto elemento in fase fenologica di post fioritura – inizio allegagione.



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia Regg. UE 611-615/2014

TRATTAMENTI FITOSANITARI

OCCHIO DI PAVONE E ALTRI PATOGENI FUNGINI

Si segnalano le ultime manifestazioni di Occhio di pavone e Piombatura. Verranno condotte nelle prossime settimane indagini precoci della nuova vegetazione. Le abbondanti precipitazioni del periodo risultano predisponenti per ulteriori attacchi di patogeni fungini e batterici. Si consiglia, in concomitanza di eventuali trattamenti nutrizionali o fitosanitari, l'aggiunta di prodotti rameici compatibili con il trattamento operato.

INSETTI

TRIPIDI

Si segnalano attacchi di tripidi. L'insetto, delle dimensioni di 1-1,5mm e dotato di apparato boccale pungente-succhiante, solitamente provoca danni alla vegetazione. In caso di attacchi importanti possono essere visitati fiori e frutti di neo formazione con perdite produttive anche importanti. In caso di presenza di 5 esemplari su mq procedere a trattamento con insetticidi abbattenti autorizzati (piretroidi, deltametrina, dimetoato, etc.) nella fase di immediatamente **successiva alla fioritura**.



Figure 2_Tripide dell'olivo.



Figure 3_Confronto di dimensioni tra tripide (in alto a sx) e fiori dell'olivo (in basso a dx)

DISSECCAMENTI E COLORAZIONI ANOMALE

Si stanno verificando in alcuni oliveti disseccamenti anomali come quelli in figura 8. È possibile riscontrare negli oliveti la presenza di branchette, o porzioni delle stesse, con colorazioni anomale, tendenti al giallo. Qualora sulle stesse si riscontrasse ingrossamento e spaccatura del legno è possibile che vi sia la presenza di larve xilofaghe di lepidotteri, quali *Euzophera spp.*(fig. 9). È stata ritrovata la presenza di *Euzophera pinguis*, non si esclude la presenza di *Euzophera bigella*. Si prega chi riscontrasse simili anomalie di contattare i tecnici di riferimento.



Figure 4_Olivo con disseccamenti diffusi sugli apici vegetativi.



Figure 5_Ingrossamenti e spaccature a carico della corteccia a seguito di attacco di *Euzophera spp.*

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CULTURALI

Gestione del terreno: procedere regolarmente agli sfalci.

Trattamenti fitosanitari: trattare con fitofarmaci autorizzati in caso di accertata presenza di importanti attacchi di tripidi.

Concimazioni: sino alla fase di allegagione è possibile apportare l'ultima frazione di concimi azotati a rapida cessione. È possibile eseguire concimazioni fogliari con boro in caso di accertata carenza dell'elemento.

Note: In caso di trattamento fogliare aggiungere un prodotto rameico compatibile.

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.

Per ogni dubbio, o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o telefonando allo 0365/651391 dalle 9 alle 13 o contattare i tecnici di zona ai seguenti numeri:

Madernini Deborah: 347-2723570 Alto Garda- Basso Garda

Zani Paolo: 328-4933440 Valtenesi-Basso Garda

Belotti Elia: 389-5990962 Valtenesi-Franciacorta

Ghilardi Matteo: 328-3033822 Sebino-Bergamasca-Valle Camonica- Basso Lario lecchese

Borelli Giandomenico: 339-8027022 Lario

Pregiamo di segnalare eventuali errori presenti nel bollettino all'indirizzo mail: matteo.ghilardi@aipol.bs.it