



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia Regg. UE 611-615/2014

## BOLLETTINO OLIVO del 06-10-2017

### FASE FENOLOGICA

#### Invaiatura

L'invaiatura su varietà precoci si può considerare pressochè conclusa negli areali più temperati. L'anticipo di colorazione dell'epidermide è da imputarsi principalmente allo stress idrico subito nei mesi scorsi. L'andamento delle maturazioni procede ora con più regolarità grazie alla disponibilità idrica presente nel terreno unita alle giornate con temperature miti e buona insolazione di questa settimana.

Dai rilievi effettuati dai nostri tecnici **si ipotizza un anticipo sulla media stagionale di circa 7-10 giorni.**




Figura 1: Esempio di invaiatura su cv. Leccino, varietà caratterizzata da una maturazione precoce

### TRATTAMENTI FITOSANITARI

#### PATOGENI FUNGINI

Dai rilievi dei nostri tecnici sono stati evidenziati, in alcune zone della Lombardia focolai di infezioni di Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*), Piombatura (*Mycocentrospora cladosporioides*) e Lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides*). Le fitopatie fungine citate risultano presenti ma mai tali da destare preoccupazione.

**Vista l'imminente raccolta, si suggerisce di sospendere qualsiasi trattamento finalizzato al contenimento di questi funghi.**

#### MOSCA DELL'OLIVO

Le basse temperature stanno limitando sensibilmente sia i voli che le deposizioni del dittero. Si ricorda che con temperature contenute anche lo sviluppo larvale verrà rallentato.

**Vista l'imminente raccolta, si suggerisce di sospendere qualsiasi trattamento sia Convenzionale che **Biologico.****

#### MATURAZIONE

Nelle zone più temperate, le cultivar precoci come il Leccino e Pendolino, stanno concludendo l'invaiatura, (cioè di viraggio dal colore verde al colore viola/nero). L'invaiatura è agli inizi nelle cultivar a maturazione tardiva come Casaliva e Frantoio.

Indicativamente, per le cultivar precoci si consiglia di iniziare le operazioni di raccolta **intorno al 15 di ottobre**, mentre le **cultivar a maturazione tardiva dovrebbero raggiungere l'optimum di maturazione a partire dal 25 del mese.**



Campagna finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dell'Italia Regg. UE 611-615/2014

## CONTENUTO IN OLIO




Figura 2: schema indicativo dello sviluppo di olio all'interno della drupa.

Di seguito alcune indicazioni di massima per areale olivicolo, sul periodo nel quale procedere con le operazioni di raccolta.

GARDA: Valtenesi e cultivar precoci a partire dal 15 ottobre.

GARDA: Alto Garda, Casaliva e areali dell'entroterra dal 20 ottobre

SEBINO bresciano: zone rivierasche 15 ottobre.

SEBINO bergamasco: zone rivierasche 15 ottobre.

FRANCIACORTA: dal 20 ottobre.

VAL CALEPIO ED ENTROTERRA: dal 20 ottobre.

LARIO: dal 20 ottobre.

VALLE CAMONICA: cultivar precoci dal 25 ottobre. Dettagli: <http://www.galvallecamonicaavaldiscalve.it>

VALTELLINA: nelle zone più miti dal 25 ottobre.

**Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.**

Per ogni dubbio, per errori o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: [info@aipol.bs.it](mailto:info@aipol.bs.it) o telefonando allo 0365/651391.