

BOLLETTINO OLIVO del 14-10-2016

FASE FENOLOGICA

Invaiatura

INTERVENTI COLTURALI

GESTIONE DEL TERRENO

Si raccomanda di effettuare con regolarità gli sfalci degli oliveti con inerbimento permanente in modo da controllare agevolmente le infestanti e preparare il terreno alla raccolta.



Figura 1: Invaiatura su cv. Leccino

TRATTAMENTI FITOSANITARI

MALATTIE FUNGINE

Si notano negli oliveti lombardi attacchi di Lebbra, soprattutto sulle cultivar precoci. Attacchi di Lebbra sono stati registrati quasi sempre in seguito ai danni causati da mosca.



Figura 2: Possibili manifestazioni di attacchi derivati da Lebbra (zone più evidenti in rosso).

MOSCA DELL'OLIVO

Con l'avvicinarsi della raccolta e in considerazione dello stato avanzato di maturazione, si **raccomanda di sospendere qualsiasi trattamento** con prodotti larvicidi (dimetoato e imidacloprid) dal momento che **per i suddetti prodotti i tempi di carenza sono pari a 28 giorni** minimi che devono trascorrere dal giorno dell'intervento all'inizio della raccolta.

Nel caso in cui si riscontrasse una situazione con olive fortemente attaccate dalla Mosca e/o Lebbra, si consiglia di ricorrere alla pratica di lotta agronomica **dell'anticipo della raccolta** per ridurre al minimo il danno qualitativo derivante dall'attacco e salvaguardare la qualità delle olive, fermo restando il rispetto del tempo di carenza.

MATURAZIONE DELLE OLIVE

Dai rilievi eseguiti dai nostri tecnici il grado di maturazione delle olive risulta essere di **circa una settimana più arretrato rispetto alla media degli ultimi anni**. Sebbene l'invaiaatura sia iniziata regolarmente le temperature di quest'ultimo periodo unite all'annata di carica hanno rallentato considerevolmente la maturazione.

In particolare, nelle zone più temperate, le cultivar precoci come il Leccino e Pendolino, stanno concludendo l'invaiaatura, (cioè di viraggio dal colore verde al colore viola/nero). L'invaiaatura è agli inizi nelle cultivar a maturazione tardiva come Casaliva e Frantoio. Pertanto per le cultivar precoci si consiglia di iniziare le operazioni di raccolta **intorno al 20 di ottobre**, mentre le **cultivar a maturazione tardiva dovrebbero raggiungere l'optimum di maturazione a partire dagli ultimi giorni del mese**.

Di seguito alcune indicazioni di massima per areale olivicolo, sul periodo nel quale procedere con le operazioni di raccolta. Le date sotto riportate sono da intendersi per olive sane.

SEBINO bresciano: varietà precoci e zone rivierasche 20 ottobre. Franciacorta 25 ottobre. Valle Camonica 30 ottobre.

SEBINO bergamasco: zone rivierasche 20 ottobre. Val Calepio ed entroterra dal 30 ottobre.

GARDA: Valtenesi e cultivar precoci a partire dal 20 ottobre.

GARDA: Alto Garda, Casaliva e areali dell'entroterra dal 25 ottobre.

LARIO: dal 25 ottobre.



Figura 3: schema indicativo dello sviluppo di olio all'interno della drupa.

RACCOLTA E MOVIMENTAZIONE DELLE OLIVE

Si raccomanda di pianificare le operazioni di raccolta cercando di ridurre al minimo la durata e di **abbreviare i tempi di conservazione delle olive prima della lavorazione in frantoio**. In particolar modo, in caso di olive colpite in misura significativa da *Bactrocera oleae*, si consiglia di lavorare le olive entro 24h dalla raccolta. In caso di danni derivati da mosca, infatti, i fenomeni di fermentazione e di conseguente deperimento qualitativo.

Si consiglia di porre le olive in contenitori finestrati (cassette o bins) in grado di consentire l'aerazione delle olive e limitare l'insorgenza di fenomeni fermentativi.



Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell'Italia
Regg. UE 611-615/2014

A causa delle caratteristiche critiche delle olive di quest'anno: presenza di fori di uscita di *Bactrocera oleae*, epicarpo spesso danneggiato dai numerosi fori di deposizione e possibile presenza di lebbra ed altri funghi provocanti marcescenze, **si consiglia di non colmare le cassette oltre la metà del loro volume** così da impedire lo schiacciamento delle drupe e scongiurare l'insacco delle fermentazioni.



Figura 4: Olive poste in cassette finestate in attesa della lavorazione.

SPECIALE AGRICOLTURA BIOLOGICA

MOSCA DELL'OLIVO - RACCOLTA

Visto l'aumento generalizzato dei danni sulla totalità delle varietà coltivate si consiglia, ove possibile, di anticipare la raccolta evitando che l'attuale generazione concluda il suo ciclo provocando i danni più consistenti sulla qualità dell'olio.

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di programmare un sopralluogo.

Per ogni dubbio o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL allo 0365/651391.