

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

PRE INDURIMENTO
NOCCIOLO

PAROLE CHIAVE:

CIMICE ASIATICA,
CASCOLA
PATOLOGICA, STRESS
IDRICO

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

10-07-2026

AREALE GARDA

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

Questa settimana è caratterizzata da **temperature leggermente al di sopra della media stagionale**, con punte che superano i 30 °C. Sia i valori massimi che quelli minimi sono in aumento, e **per la prossima settimana è prevista un'ulteriore ondata di calore**. Dal punto di vista fenologico, **le varietà di olivo da olio si trovano nella fase di pre-indurimento del nocciolo**, sebbene emergano differenze varietali: tra le cultivar più diffuse, **il Leccino risulta essere il meno avanzato nello sviluppo fisiologico**. Per quanto riguarda le **varietà da mensa**, in alcuni casi si è già raggiunto **l'indurimento del nocciolo**. Si segnalano i **primi sintomi di stress idrico sulle piante in produzione**, con olive che iniziano a raggrinzirsi. Nelle **aree maggiormente esposte allo stress termico**, si osservano inoltre **olive imbrunite e disseccate**, che restano attaccate alla pianta per poi cadere una volta completamente essiccate. Nei campi dove non si è trattato contro **cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)**, si segnala la presenza dell'insetto **con il rinvenimento in campo** sia di **ovature** che **neanidi**, accompagnato dalla presenza di **cascola patologica dei frutti**, i casi sono diffusi in tutto l'areale con segnalazioni anche in alto Garda (Gargnano, Tignale).

I monitoraggi hanno evidenziato un aumento delle catture di **adulti di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*)** anche se numericamente ancora molto contenuto. Le catture di ***Euzophera pinguis*** sono in aumento ma ancora esigue mentre per ***Euzophera bigella*** restano sporadiche. Al momento, la **presenza di margaronia (*Palpita unionalis*)** è molto bassa.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Avendo rilevato i primi **sintomi di stress idrico** si consiglia **agli olivicoltori che abbiano un impianto d'irrigazione di procedere a irrigazioni di soccorso** per cercare di mantenere lo stato idrico delle piante. Potrebbe essere **utile l'utilizzo di farine di roccia (caolino, zeolite e bentonite)** per **diminuire la traspirazione e abbassare le temperature della drupa**. Mantenere monitorati i giovani impianti dove l'impatto dello stress idrico è più severo.

Procedere alla normale gestione del cotico erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Si invitano tutti gli olivicoltori a effettuare **un attento monitoraggio** dei propri oliveti. **In caso di accertata presenza del fitofago o di comparsa dei primi sintomi di cascola, si raccomanda un intervento tempestivo** con un prodotto specifico per il contenimento della cimice, da applicare **in abbinamento alle polveri di roccia** (per creare un effetto deterrente verso il rientro dell'insetto in campo).

Al momento, gli **unici principi attivi registrati contro la cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)** e utilizzabili **su olivo** sono **la deltametrina e il piretro naturale**. Altri prodotti che contengono il p.a. Acetamiprid e registrati su olivo per Mosca (*Bactrocera oleae*), Tignola (*Prays oleae*), Sputacchina (*Philaenus spumarius*) e Cecidomia fogliare dell'olivo (*Dasineura oleae*) hanno un'azione collaterale anche su cimice asiatica ma non sono registrati per questo fitofago.

I principi attivi utilizzabili e registrati sono riassunti nello specchietto sottostante.

TRATTAMENTI CIMICE ASIATICA	
CONVENZIONALE	Prodotti a base di Deltametrina
BIOLOGICO	Prodotti a base di Piretrine naturali *

*si consiglia di acidificare la soluzione durante la preparazione della miscela (pH ideale tra 6 e 6,5), e procedere al trattamento nelle ore più fresche della giornata possibilmente verso sera.

Questi trattamenti possono essere uniti alla distribuzione di antitraspiranti farine di roccia (caolino, bentonite, zeolite).

CONSIGLI D'INTERVENTO



Drupe che mostrano gli effetti della
carenza idrica- areale Garda-



Adulto di cimice asiatica su drupa -
areale Garda-

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti della zona del Sebino la fase fenologica è attualmente accrescimento drupa \ pre-indurimento del nocciolo. Continuano a persistere le **alte temperature** (superiori ai 30°) che determinando un'elevata evapotraspirazione e un persistente **stress idrico**, soprattutto **negli impianti giovani** e in quelli **produttivi su terreni superficiali**.

Le condizioni climatiche attuali: caratterizzate da alte temperature, forte irraggiamento e **ridotta disponibilità idrica**, rendono auspicabile l'adozione di **strategie mirate alla mitigazione dello stress idrico**. Al momento non si segnalano episodi significativi di cascola patologica; la **caduta di olive osservata in campo è da ricondursi prevalentemente allo stress termico**. Per quanto concerne *Halyomorpha halys*, sebbene la sua presenza negli oliveti sia possibile, la **situazione si mantiene sotto controllo**. Non essendosi indurito ancora il nocciolo **si raccomanda comunque un monitoraggio costante**, con **particolare attenzione agli impianti limitrofi a frutteti o aree urbanizzate**. Per la **mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*) le **elevate temperature superiori ai 30 °C continuano a limitarne l'attività**.

Le alte temperature e il clima asciutto limitano il rischio di nuove infezioni fungine, anche se permangono i sintomi delle infezioni di occhio di pavone primaverili, ma senza nuove infezioni significative in assenza di piogge persistenti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Persistendo **condizioni predisponenti allo stress idrico e termico**, si raccomanda di **monitorare** con particolare attenzione gli **impianti giovani e quelli su suoli superficiali**, per scongiurare prolungati periodi di mancanza di acqua nella fase di accrescimento delle drupe. Laddove disponibile, è **consigliato procedere con irrigazioni di soccorso**. È consigliabile inoltre **procedere con l'applicazione di farine di roccia** (caolino, zeolite e bentonite) che contribuiscono a ridurre la temperatura fogliare, contenere la disidratazione dei tessuti e offrire una barriera fisica nei confronti di alcuni fitofagi. Si raccomanda, infine, di mantenere una corretta gestione del cotico erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI

Per quanto riguarda gli interventi fitosanitari consigliati. Per **mosca dell'olivo** si consiglia agli olivicoltori che montano **trappole di cattura massale di concluderne il posizionamento in campo**.

In caso di presenza diffusa di cimice asiatica e di cascola patologica, si **consiglia di intervenire con prodotti a base di piretro naturale (bio) o deltametrina**. Per interventi mirati al controllo di altri fitofagi, si ricorda che alcuni principi attivi, come l'acetamiprid, possono esercitare un effetto di contenimento anche nei confronti della cimice asiatica.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella dell'**accrescimento del frutto/pre-indurimento del nocciolo**.

La costante carenza di acqua in questo periodo sta portando le piante verso un **importante stress idrico**. Si possono apprezzare, già nelle situazioni più complesse, **i danni da secco, visibili con una cascola diffusa su tutta la pianta. Le olivette**, con l'embrione ancora non protetto dal nocciolo, **diventano necrotiche e si staccano facilmente dalla mignola**. La varietà che più risente di questo stress abiotico è il leccino.

Inoltre, in molti campi, è **ancora presente la cimice asiatica**, che continua ad attaccare le drupe, facendole cascolare. In questo caso il **danno si presenta più localizzato nelle parti di chioma dove è passato l'insetto**. Anche questa settimana si riscontra **un'ottima presenza del parassitoide**, che sta limitando le infestazioni di cimice.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase **continuare con la normale gestione del cotico erboso**.

Per far fronte allo **stress idrico** è opportuno **intervenire**, dove possibile, con **irrigazioni di soccorso**. Se non ci fosse la possibilità, si potrebbe valutare l'**utilizzo di farine di roccia** (caolino, zeolite e bentonite), per **limitare l'evapotraspirazione della pianta, quindi limitare il fabbisogno idrico**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Laddove si riscontri una **presenza significativa di cimice asiatica**, si consiglia di **procedere allo sfalcio del cotico erboso** e di **effettuare gli interventi fitosanitari nelle ore più fresche**, utilizzando prodotti a base di **piretroidi** (in regime di difesa integrata) o di **piretro naturale** (in agricoltura biologica). In quest'ultimo caso, è fondamentale acidificare l'acqua portando il pH a un valore compreso tra 5,5 e 6 prima dell'aggiunta del prodotto, e applicare il trattamento in assenza di irraggiamento solare diretto, data la fotolabilità della molecola. La riuscita dell'operazione è determinante per l'efficacia: particolare cura va riservata alla bagnatura completa e uniforme dell'intera chioma.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Ovatura di cimice asiatica con neanidi appena nate areale Lario



Olive colpite da siccità-areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDI GAL Sebino e Valle Camonica

Per i soci del Sebino si comunica che il Gal Sebino e Valle Camonica ha pubblicato i Bandi SRD08 - SRE04 - SRD12.1SRD12.2°.

A tale proposito per chi fosse interessato qui sotto si riportano i link:

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2034

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2035

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2036

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2037

Si ricorda che per tutti gli aggiornamenti di visitare il sito www.galsebinovallecamonica.it

BANDO APERTO

Si comunica che la **CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dall'17 marzo 2026 fino al 33 ottobre 2026**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

WORKSHOP "LA CIMICE ASIATICA E LA MARGARONIA"

Nell'ambito del **Programma strategico per l'olivicoltura del Parco Alto Garda Bresciano**, si segnala il workshop **"La cimice asiatica e la Margaronia"**, in programma **sabato 11 luglio 2026** presso la **Sala Civica Castellani** di Gargnano, con inizio alle ore **8.30**.

Relatori dell'incontro saranno i **tecnici AIPOL**, che guideranno i partecipanti attraverso una mattinata dedicata al riconoscimento, al monitoraggio e alla difesa da questi due insetti sempre più dannosi per l'olivicoltura locale.

L'evento rientra tra le prime attività del Programma rivolte all'**approfondimento delle patologie e delle avversità dell'olivo**, con l'obiettivo di **trasferire conoscenze pratiche agli olivicoltori** e favorire una produzione più **costante, consapevole e sostenibile** nel tempo.

La partecipazione è libera e gratuita