

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

### FASE FENOLOGICA

RIPRESA VEGETATIVA-  
ACCRESIMENTO DEL  
GERMOGLIO

#### PAROLE CHIAVE:

OCCHIO DI PAVONE,  
EUZOPHERA,  
CONCIMAZIONE,  
POTATURA

**"Monitoraggio assistenza  
tecnica, formazione e diffusione  
di buone pratiche per la  
salvaguardia dell'olivicoltura  
nelle provincie di Bergamo,  
Brescia, Como e Lecco "**

### BOLLETTINO OLIVO

**11-04-2025**

**Prossimo bollettino 24-04-2025**

### TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

## AREALE GARDA

Nelle ultime due settimane il tempo è stato prevalentemente soleggiato. Nella prima parte si sono registrate temperature piuttosto elevate, tipiche della media primaverile, mentre in questi ultimi giorni si è verificato un calo termico. Tutte le varietà sono in fase di **ripresa vegetativa, allungamento dei germogli**. Continua a essere segnalata, in particolare sulla Casaliva, la **presenza di larve e crisalidi di Euzophera spp.** Nonostante nelle ultime due settimane il clima sia stato meno favorevole alla diffusione di malattie fungine come l'occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*), **si consiglia comunque di monitorare eventuali infezioni latenti in corso.**

## SITUAZIONE FITOSANITARIA

Gli olivi sono ora in piena ripresa vegetativa. **Per favorire lo sviluppo dei nuovi germogli**, si può intervenire con una **concimazione azotata**, impiegando prodotti come **urea, solfato ammonico o nitrato ammonico**, oppure scegliendo **fertilizzanti autorizzati in agricoltura biologica**. In alternativa, per un approccio più equilibrato, è **possibile utilizzare concimi NPK complessi**, che garantiscono un apporto di **azoto, fosforo e potassio**. È importante, tuttavia, **evitare dosi eccessive di azoto**, poiché potrebbero predisporre le piante ad attacchi di funghi patogeni e insetti fitofagi.

**Proseguire con gli interventi di potatura**, avendo cura di **disinfettare accuratamente gli attrezzi utilizzati**. Questa misura è essenziale per limitare la trasmissione della rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*), soprattutto nelle zone coltivate con varietà più suscettibili come la Casaliva.

## CONSIGLI AGRONOMICI

È fondamentale eseguire **senza ritardo i trattamenti rameici preventivi post-potatura**. Per garantire la massima efficacia protettiva, si raccomanda ancora un **approccio scalare**: applicare **prodotti rameici (come poltiglia bordolese, ossicloruro, idrossido di rame o solfato di rame tribasico)** immediatamente dopo il completamento della potatura di ogni singola parcella o gruppo di piante, senza attendere la fine di tutti i lavori. Questa strategia permette di: **ottimizzare la tempistica dei trattamenti, ridurre la finestra di vulnerabilità delle ferite alla rogna dell'olivo, massimizzare l'efficacia protettiva contro le infezioni.**

## CONSIGLI D'INTERVENTO



Larva di Euzophera-spp. - AREALE GARDA



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE SEBINO

La fase fenologica rilevata in campo è ancora **ripresa vegetativa**

Nelle ultime settimane le condizioni meteorologiche sono state prevalentemente stabili, con temperature nella norma per il periodo. **Non si registrano particolari criticità fitosanitarie**: i casi di filloptosi associati a patologie fungine, in particolare alle infezioni da *Spillocaea oleaginea* (occhio di pavone), rimangono ancora contenuti e non mostrano un'ampia diffusione. Si segnala ancora la presenza in campo degli **adulti di cimice asiatica** che stanno uscendo dalla **fase di svernamento**.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

#### Continuare con le potature.

Sospendere le concimazioni organiche e completare le concimazioni minerali.

### CONSIGLI AGRONOMICI

Al **termine delle operazioni di potatura**, si consiglia di eseguire un **trattamento fitosanitario con prodotti a base fungicida e batteriostatica**, distribuendoli su tutta la chioma e in particolare sulle ferite fresche. A questo scopo, risultano **particolarmente efficaci i formulati rameici**, come idrossido di rame, poltiglia bordolese, ossicloruro o solfato tribasico. Negli **oliveti che hanno subito gravi infestazioni fungine nella stagione precedente**, può essere utile ricorrere a **principi attivi sistemici** come la **dodina** (in grado di penetrare nei tessuti) o **il fosfonato di potassio**.

### CONSIGLI D'INTERVENTO



CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## AREALE LARIO

Fase fenologica: **ripresa vegetativa**

Procede gradualmente il **risveglio** delle piante, che **accregono progressivamente i nuovi germogli**. Si osserva una progressiva fuoriuscita dei fitofagi dai loro rifugi invernali. In numerosi casi si **riscontrano sintomi di occhio di pavone**, in particolare nei **campi dove non è stato eseguito un trattamento rameico o anticrittogamico post-raccolta**.

### SITUAZIONE FITOSANITARIA

Prosegue la fase delle **potature**, un'operazione agronomica fondamentale **da eseguire annualmente** per garantire uno **sviluppo equilibrato e produttivo della chioma**. In numerosi oliveti si osserva una **forte presenza di rogna**, **spesso associata a infestazioni di *Euzophera spp.*** In tali situazioni, durante gli interventi di potatura, è essenziale limitare al minimo le ferite alla pianta, privilegiando il recupero di legno sano ed evitando squilibri vegetativi.

È possibile **procedere ad una concimazione azotata**.

### CONSIGLI AGRONOMICI

A **seguito** di interventi di **potatura**, si raccomanda l'applicazione di un **trattamento rameico** a base di **ossicloruro di rame o poltiglia bordolese**, risulta fondamentale la tempistica dell'intervento: **il prodotto deve essere distribuito entro 24-48 ore dal taglio**, al fine di garantire un'adeguata azione cicatrizzante e protettiva sui tessuti vegetali esposti. Tale pratica risulta efficace nella **profilassi delle infezioni fungine** a carico degli apparati fogliari e nel **contenimento di patologie batteriche**, tra cui *Pseudomonas savastanoi* (agente eziologico della rogna dell'olivo). Negli **oliveti con elevate infezioni da occhio di pavone** (soprattutto su cultivar Frantoio e Bianchera), si raccomanda un **trattamento a base di dodina**.

### CONSIGLI D'INTERVENTO





CAMERA DI COMMERCIO  
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

## NOTIZIE IMPORTANTI

Regione Lombardia ha emesso un **Decreto (n. 3263 del 12/03/2025)** che introduce misure importanti per la protezione degli olivi da organismi nocivi che causano danni significativi, come la **rogna dell'olivo, euzophera spp. e altre malattie.**

Il decreto prevede in sintesi la **combustione dei residui di potatura** anche nel periodo di cui normalmente è vietata (dal 1° ottobre al 31 marzo) con lo **scopo di contenere e ridurre la diffusione di alcuni pericolosi patogeni** che possono annidarsi nei residui vegetali. **I residui andranno bruciati in piccoli cumuli di massimo 3 metri steri per ettaro al giorno** seguendo le buone **pratiche di gestione** per evitare rischi ambientali.

La misura è valida per **tutti i conduttori di oliveti**, sia proprietari che affittuari, nelle aree delle denominazioni di origine protetta "**Garda**" e "**Laghi lombardi**" ed è in vigore per il **2025**, con la possibilità di proroga in base alla situazione fitosanitaria.

**Attenzione che il presente decreto non deroga alla normativa vigente riguardante la qualità dell'aria né ad eventuali divieti specifici, quali, a titolo esemplificativo, il superamento della soglia di PM10 o i divieti di combustione in caso di rischio incendi. Si consiglia pertanto di informarsi adeguatamente prima di procedere con la combustione delle ramaglie, al fine di evitare di incorrere in sanzioni.**

**Si ricorda, inoltre, che rimane in vigore il divieto di combustione dei residui agricoli e forestali a una distanza inferiore a 100 metri dalle aree boschive (art. 45, comma 4 della l.r. n. 31 del 2008).**

Per ulteriori dettagli, potete consultare il **Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)** o il sito del **Servizio Fitosanitario Regionale**.

In allegato il link per consultare il decreto sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia:

<https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/DettaglioRedazionale/comunicati-e-notizie/comunicati/red-potature-olivo-sfr>

### BANDO IN APERTURA

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'17 aprile 2025 fino al 31 ottobre 2025**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/impres-olivicole>

