

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

PRIMO
ACCRESIMENTO
DRUPE

PAROLE CHIAVE:

CIMICE ASIATICA, ALTE
TEMPERATURE

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

19-06-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

In questa settimana si è registrato un **tempo stabile e soleggiato**, con **temperature superiori alla media stagionale**, che nei **prossimi giorni** culmineranno in un'**ondata di caldo**. Rispetto alle potenzialità dell'annata, si **conferma che l'ondata di calore** durante la **fioritura** ha **influenzato negativamente l'allegagione**, causando una **riduzione della quantità di frutti allegati**, sebbene **l'allegagione stessa risulti complessivamente discreta**. La **fase fenologica** attualmente osservata è il **primo stadio dell'accrescimento delle drupe**, mentre si sta concludendo la cascola fisiologica naturale dei fiori non fecondati. Le **catture** di adulti di **mosca dell'olivo risultano sporadiche e in numero molto basso**. Per quanto riguarda la **cimice asiatica**, si segnala una **presenza sporadica** con esigue consistenze numeriche all'interno dell'oliveto, e non **sono stati riscontrati casi di cascola patologica**. Anche le **catture di *Euzophera pinguis* ed *Euzophera bigella* sono scarse**. È stata rilevata, inoltre, la presenza sporadica di cotonello dell'olivo (*Euphyllura olivina*) e di cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*). Al momento, non è ancora stata osservata in campo la presenza di margaronia (*Palpita unionalis*).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Per quanto riguarda le pratiche agronomiche da svolgere in campo in questa fase, si può **proseguire con la normale gestione del cotico erboso**. In vista dell'imminente **ondata di caldo**, che interessa un periodo ancora delicato per la coltura, **si consiglia, a chi dispone di un impianto d'irrigazione, di mantenere un adeguato stato idrico delle piante per limitare eventuali stress termici**. Particolare **attenzione** va riservata **agli impianti giovani**: per questi si raccomanda di **monitorare lo stato idrico** e, se necessario, **intervenire con un'irrigazione di soccorso**.


CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale
Garda

Attualmente **non si ritiene siano necessari interventi fitosanitari**.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Neanide di seconda età di
cimice asiatica-Areale Garda-



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli oliveti della zona del Sebino, la **fase fenologica principale è l'accrescimento drupe**. Le **elevate temperature registrate negli ultimi giorni**, con **massime spesso superiori a 30 °C**, stanno aumentando l'evapotraspirazione e lo **stress idrico** negli **oliveti più giovani** e negli **oliveti produttivi posti su terreni superficiali**. In questa fase di accrescimento delle drupe è **importante mantenere un adeguato equilibrio vegeto-produttivo e limitare gli stress sia idrici che termici**. Si segnalano **sporadiche presenze di Margaronia** (*Palpita unionalis*) su germogli e foglie giovani, mentre per la **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) si osservano **neanidi di prima età**. Si raccomanda di monitorare attentamente gli oliveti vicini a frutteti e aree urbane, verificando nelle prossime settimane l'eventuale presenza di nuove ovideposizioni. Le catture di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) sulle trappole **risultano costanti ma ancora contenute**. In alcune aree si segnala un **aumento della presenza di cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*).

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Dato l'ondata di caldo in arrivo, si raccomanda di **prestare particolare attenzione agli oliveti giovani e ai terreni poco profondi**, evitando prolungati stress idrici durante la fase di accrescimento delle drupe; **laddove disponibile, è opportuno programmare interventi irrigui di soccorso**. Per quanto concerne l'impiego di polveri minerali, l'utilizzo di **caolino, zeolite e bentonite** può **contribuire a ridurre la temperatura fogliare, limitare la disidratazione dei tessuti e come barriera contro alcuni fitofagi**. Continuare con la gestione del cotico erboso.

CONSIGLI AGRONOMICI

Per quanto riguarda gli interventi fitosanitari consigliati. Per **mosca dell'olivo** si consiglia agli olivicoltori che montano **trappole di cattura massale di concluderne il posizionamento in campo**. In presenza di **infestazioni di cocciniglia mezzo grano di pepe oltre la soglia d'intervento** (*La soglia d'intervento viene superata quando si riscontra una densità media di 5 neanidi per foglia oppure la presenza di 1 neanide per cm lineare di rametto, considerando un campione di 10 cm di lunghezza*), si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata con olio minerale o sali potassici degli acidi grassi, garantendo una buona copertura della pagina inferiore delle foglie.

In caso di presenza diffusa di cimice asiatica e di cascola patologica, si consiglia di intervenire con prodotti a base di **piretro naturale (bio) o deltametrina**. Per interventi mirati al controllo di altri fitofagi, si ricorda che alcuni principi attivi, come l'acetamiprid, possono esercitare un effetto di contenimento anche nei confronti della cimice asiatica.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella dell'**accrescimento delle drupe**.

Nella maggior parte degli areali il **carico produttivo dell'annata risulta essere buono e in alcuni casi ottimo**. Si segnala **un aumento** della presenza in campo di **cimice asiatica** con un **incremento proporzionale della cascola patologica** (cascola verde). La varietà più sensibile all'attacco del fitofago risulta essere il leccino. La cimice asiatica è nota per essere un insetto polifago, oltre a trovarla in oliveto la si trova su altre piante da frutto o negli orti. Gli spostamenti da una coltura all'altra sono frequenti e piuttosto veloci.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase **continuare con la normale gestione del cotico erboso**.

In presenza di una **carica di olive allegate elevata**, è possibile **integrare lo stato nutrizionale delle piante ricorrendo a concimi fogliari**, al fine di **sostenere la produzione** e, contestualmente, **favorire l'allungamento dei nuovi germogli**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Per il **contenimento della cimice asiatica** si raccomanda un **monitoraggio costante degli oliveti**, finalizzato a **tenere sotto controllo la pressione dell'insetto** e a **valutare l'eventuale insorgenza di cascola patologica**. **Dove necessario, si può intervenire**, previo sfalcio del cotico erboso, con **prodotti a base di piretroidi** (in regime di difesa integrata) o di **piretrine** (in regime di difesa biologica). Per garantire l'efficacia del trattamento, è fondamentale **attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta** e **assicurare una bagnatura uniforme e completa della chioma**, sia nella parte interna che in quella esterna.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Ovatura di cimice asiatica con neanidi di prima e seconda età-areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDI GAL Sebino e Valle Camonica

Per i soci del Sebino si comunica che il Gal Sebino e Valle Camonica ha pubblicato i Bandi SRD08 - SRE04 - SRD12.1SRD12.2°.

A tale proposito per chi fosse interessato qui sotto si riportano i link:

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2034

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2035

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2036

www.galsebinovallecamonica.it/scheda-promo/bandi-gal-pac-2023-2037

Si ricorda che per tutti gli aggiornamenti di visitare il sito www.galsebinovallecamonica.it

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dall'17 marzo 2026 fino al 33 ottobre 2026**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO TECNICO

In occasione dell'assemblea dei soci AIPOL, che si terrà lunedì 29 giugno a Puegnago del Garda in Via Roma 4 nella cornice di Villa Galnica, a partire dalle 10.30 è previsto un incontro dal titolo: **“IL PUNTO SULL'ANDAMENTO DELLA COLTIVAZIONE A METÀ STAGIONE E QUALI STRATEGIE ADOTTARE IN FUNZIONE DEI VARI SVILUPPI CLIMATICI”**. La partecipazione all'evento è libera e gratuita.

