



FASE FENOLOGICA

ALLEGAGIONE

PAROLE CHIAVE:

PULITURA MIGNOLE,
CIMICE ASIATICA

BOLLETTINO

OLIVO

21.06.2024

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

Questa settimana è stata caratterizzata da alcuni temporali, seguiti da giorni sereni e con temperature elevate. Si segnala una situazione eterogenea per quanto riguarda la popolazione di **cimice asiatica** (*Halyomorpha Halys*), in alcune zone la popolazione risulta in aumento, mentre in altre zone è stazionaria o poco presente. Per i fitofagi secondari **non si registrano rosure di margaronia** (*Palpita unionalis*) continua ad esserci una presenza molto contenuta di **cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*) e **cotonello dell'olivo** (*Euphyllura olivina*). In generale i **fitofagi secondari non destano preoccupazione**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In tutti gli oliveti monitorati la fioritura si è conclusa, e si sta verificando **la pulitura delle mignole dai fiori abortiti mentre le olive allegate cominciano ad ingrossarsi** per chi ancora non l'avesse eseguita è ancora possibile **eseguire una concimazione fogliare con il BORO** ma solamente in quegli oliveti dove cronicamente è presente questo problema.

CONSIGLI AGRONOMICI

I monitoraggi hanno restituito una situazione eterogenea per quanto riguarda la popolazione di **cimice asiatica**. Nella **zona di Raffa e Picedo la popolazione risulta essere in aumento**. **Si consiglia gli olivicoltori di queste due località di monitorare la situazione in campo in caso di necessità contattare i tecnici AIPOL**. Nelle altre località gardesane (basso Garda, e alto Garda) si è rilevata una popolazione di cimice stazionaria e in alcuni casi molto bassa o non ancora presente. Si consiglia comunque agli olivicoltori di monitorare la presenza dell'insetto in campo poiché in alcuni casi la situazione può variare da località a località entro lo stesso comune.

Nel caso di alta presenza dell'insetto si consiglia agli olivicoltori di segnalare la situazione con una mail o telefonicamente ai tecnici.



Neanide di III età- Valtenesi

CONSIGLI D'INTERVENTO

Si ricorda che l'unico principio attivo registrato per questo **fitofago** su **olivo** è **Deltametrina** per i consigli di lotta si ricorda di consultare l'approfondimento redatto dai tecnici AIPOL.


Si ripropone il link alla scheda di approfondimento:
<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

N.B. Per i trattamenti fitosanitari seguire sempre le dosi d'etichetta e rispettare i tempi di rientro e di carenza e tutti gli accorgimenti per un corretto uso dei P.F.

CONSIGLI D'INTERVENTO



*Fase fenologica attuale-
Valtinesi*



*Adulti di Cimice asiatica-
Valtinesi*



*Ovatura di cimice asiatica con
neanidi di I Età- Alto Garda*



*Fase fenologica attuale-Alto
Garda*

AREALE SEBINO

La fase fenologica riscontrata in campo è **allegagione**

Si riscontra la **presenza di adulti, ovature e neanidi** ai primi stadi **di cimice asiatica**. La presenza è stata riscontrata su tutto il territorio del Sebino e della provincia bergamasca con infestazioni variabili.

Si segnala la **presenza di mosca dell'olivo** riscontrata sia in pianta che su trappole di monitoraggio. **Attualmente l'oliva non risulta recettiva nei confronti delle deposizioni di Bactrocera oleae**. riscontrata la presenza di adulti di cocciniglia mezzo grano di pepe, non si segnala la presenza di neanidi.

La **cascola verde presente in misura variabile** in relazione alla zona considerata, con **maggior intensità su varietà Leccino**. Gli areali più precoci (**Predore, Riva di Solto, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Iseo, Montisola**) risultano **più interessati da questo fenomeno**, mentre **i rimanenti risultano ancora poco o nulla interessati da cascola verde**. Per chi volesse approfondire si rimanda alla scheda redatta dai tecnici AIPOL e disponibile sul nostro sito al link: <https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Risulta **possibile eseguire un'integrazione del BORO** tramite una **concimazione fogliare solo per quegli oliveti dove la carenza di questo elemento sia cronica**.

CONSIGLI AGRONOMICI

Si suggerisce **l'impiego di trattamenti abbattenti nei confronti di cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) **solamente in presenza di rinvenimento di esemplari si consiglia di contattare il tecnico di zona. Contattare il tecnico prima di effettuare interventi fitosanitari**. Ricordiamo che l'unico principio attivo ad oggi autorizzato su olivo contro il fitofago cimice asiatica è Deltametrina.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Fase fenologica rilevata - areale sebino



Adulti di cimice asiatica

AREALE LARIO

Gli olivi sono nella fase fenologica **fine fioritura-allegagione**.

la fioritura è terminata nella maggior parte degli areali, si incominciano a vedere i risultati dell'**allegagione**, che si riscontra essere **ottima in molti casi**. Nelle zone più precoci si rilevano le **prime avvisaglie di cimice asiatica**.

I tecnici AIPOL hanno redatto una scheda di approfondimento su Cimice asiatica per chi fosse interessato la scheda è disponibile sul sito al link:

<https://aipol.bs.it/controlpanel/uploads/approfondimento%20cimice%20asiatica%20aipol%202024.pdf>

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Si consiglia di effettuare gli **sfalci all'interno dei campi**, per eliminare momentaneamente i fiori, al fine ultimo di **avere le condizioni migliori per effettuare un eventuale trattamento contro la cimice e impattare il meno possibile su altri insetti utili**.

È importante nelle annate di carica sostenere le piante con una buona concimazione fogliare, per limitare il fenomeno dell'alternanza produttiva.

CONSIGLI AGRONOMICI

Per chi non avesse fatto un trattamento in boro e riscontrasse carenze specifiche, è ancora possibile effettuarlo.

In questa fase è consigliabile **monitorare attentamente i propri oliveti e verificare la presenza o meno di cimice asiatica**. Se i livelli di **infestazione** dell'insetto fossero **già elevati, contattare il tecnico di zona per adottare la strategia di difesa più corretta**. In questo periodo è consigliabile eseguire un **trattamento a base di rame per limitare lo sviluppo di infezioni fungine**. Eventualmente abbinarlo con l'intervento contro la cimice, quando sarà il momento (verificare sempre la miscibilità dei prodotti).

CONSIGLI D'INTERVENTO

NOTIZIE UTILI E COMUNICAZIONI

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2402)**, le domande possono essere **presentate dall'8 Aprile 2024 fino al 31 Ottobre 2024**. Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

BANDI