

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

FASE FENOLOGICA

SECONDO
ACCRESIMENTO DEL
FRUTTO

PAROLE CHIAVE:

ALLEVIAMENTO STRESS
IDRICO

**"Monitoraggio assistenza
tecnica, formazione e diffusione
di buone pratiche per la
salvaguardia dell'olivicoltura
nelle provincie di Bergamo,
Brescia, Como e Lecco "**

BOLLETTINO OLIVO

28-08-2026

TECNICI

AREALE GARDESANO

Olmo Bonzi: 340-0002464

Paolo Zani: 328-4933440

Deborah Madernini: 347-2723570

AREALE SEBINO

Luigi Alberti: 340-8903484

AREALE LARIANO

Riccardo Pozzi: 334-8154399

AREALE GARDA

La settimana appena trascorsa è stata segnata dal transito di alcune **perturbazioni**, che hanno portato a un **generale calo termico**. Le **temperature**, sia minime che massime, sono **ritornate nella media del periodo**, con massime di 30-31°C. Le **precipitazioni** verificatesi nei primi giorni della settimana **hanno inoltre contribuito a ricostituire parzialmente le riserve idriche del suolo**, dopo un periodo di siccità. Le **piogge hanno alleviato lo stress idrico** a carico delle piante. Dal punto di vista **fenologico**, continua la **fase di accrescimento dei frutti in tutte le varietà**. Si segnalano in **alcune località del basso Garda** e della **Valtenesi grandinate** con chicchi anche di grosso diametro.

In campo è stata riscontrata **la presenza di diverse specie di cimici**, tra cui la **cimice asiatica** (*Halyomorpha halys*) e la **cimice verde** (*Nezara viridula*). Gli individui osservati si presentano in vari stadi di sviluppo, dalle neanidi alle ninfe fino agli adulti. Al momento, tuttavia, i livelli di popolazione **non hanno causato danni tali da rendere necessario un intervento fitosanitario**. Sebbene le attuali **condizioni climatiche** risultino teoricamente **favorevoli allo sviluppo della mosca dell'olivo** (*Bactrocera oleae*), le **catture di adulti** nelle trappole **restano pressoché nulle**. Non è stata rilevata alcuna ovideposizione fertile. Su alcuni frutti si osservano fori di sfarfallamento riferibili a generazioni precedenti; all'interno delle olive sono state rinvenute pupe. Per quanto concerne **Euzophera**, le **catture di adulti rimangono su livelli molto contenuti** per entrambe le specie. Si segnala inoltre la presenza di **rosure attribuibili a margaronia** (*Palpita unionalis*), ma **i danni** osservati si mantengono ben al di **sotto delle soglie di intervento**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questa fase fenologica, sui **nuovi impianti e sugli oliveti sottoposti a riforma**, si possono **effettuare operazioni di potatura verde** finalizzate all'**asportazione** di **polloni e succhioni**.

CONSIGLI AGRONOMICI



Fase fenologica-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

Anche se le condizioni climatiche sono **favorevoli** per la **mosca dell'olivo**, attualmente **non si rilevano attacchi** e la **popolazione risulta essere molto bassa**. Nonostante questo, si continua a raccomandare il **campionamento di 100 drupe**, verificando attentamente la presenza di **punture di ovideposizione** nonché di **uova e larve vitali in sviluppo** al di sotto dell'epidermide del frutto. Il monitoraggio dell'infestazione attiva permette di intervenire nelle prime fasi dell'attacco contenendo i danni causati dall'insetto.

Particolare attenzione va riservata agli **oliveti in cui ci siano già segni di attacco, come punture e fori di sfarfallamento**, nei quali si raccomanda di attivare **interventi di lotta preventiva**. Nel caso le **piogge abbiano dilavato i prodotti repellenti** utilizzati per la lotta preventiva alla mosca, si **consiglia di procedere a rinforzare la copertura sulle drupe o a redistribuire i prodotti adulcifici**.

A seguito delle **grandinate registrate** in alcune **località dell'areale**, si raccomanda, **in presenza di danni**, di **intervenire con prodotti rameici entro le 48 ore successive all'evento**. Tale intervento è **volto a contenere il rischio di infezioni da rogna dell'olivo**, con particolare attenzione alle cultivar più suscettibili.

Nello specchietto vengono riassunti i trattamenti consigliati

LOTTA PREVENTIVA MOSCA DELL'OLIVO

Utilizzo di repellenti Caolino, Zeolite più adesivanti, utilizzo di esche proteiche avvelenate, installazione di trappole di cattura massale.



Foro di sfarfallamento--areale Garda

CONSIGLI D'INTERVENTO



Larva di mosca dell'olivo morta per le condizioni ambientali avverse-areale Garda



Rosure di margaronia-areale Garda

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE SEBINO

Negli **oliveti del Sebino e della Franciacorta** la **fase fenologica** prevalente è di **fine accrescimento delle drupe**, inolizione, nelle varietà più precoci inizio invaiatura.

Le **precipitazioni** degli ultimi giorni **hanno interrotto il prolungato periodo caldo e siccitoso** delle settimane precedenti e **stanno favorendo la reidratazione delle drupe**, soprattutto negli oliveti che avevano manifestato evidenti sintomi di stress idrico. **Le piogge rappresentano un elemento favorevole per gli oliveti del territorio**, molti dei **quali presentavano gravi sintomi di stress idrico**, con raggrinzimento delle drupe, perdita di turgore e rallentamento dell'accrescimento. **Si segnala** inoltre che **diverse località del Sebino e Franciacorta** sono state **colpite da grandinate** anche di una certa intensità.

Per quanto riguarda la **mosca dell'olivo**, anche questa settimana **non si registrano catture nelle trappole né infestazione attiva**. Questo dato non deve tuttavia portare ad abbassare il livello di attenzione. Il calo delle temperature, **l'aumento dell'umidità e la reidratazione delle olive** stanno determinando **condizioni decisamente più favorevoli all'attività degli adulti e all'ovideposizione** rispetto alle settimane precedenti.

Si segnalano infine **presenze localizzate di cimice asiatica**, neanidi di cocciniglia e un **incremento delle rosure apicali da margaronia**, che al momento **non giustificano interventi generalizzati**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

In questo periodo, sugli impianti di nuova messa a dimora e su quelli in riforma, è possibile intervenire con la **potatura verde** per rimuovere polloni e succhioni.

CONSIGLI AGRONOMICI

In questa fase la **priorità** è rappresentata dal **monitoraggio della mosca dell'olivo**. È necessario mantenere sotto stretto controllo **le trappole** e, soprattutto, **intensificare il campionamento diretto delle olive**, poiché l'assenza di catture non è sufficiente a escludere l'inizio delle ovideposizioni.

Nei campioni dovranno essere **ricercate** le **punture di ovideposizione**, e conteggiare **uova e larve vive**, così da **valutare l'effettiva infestazione attiva**. Particolare **attenzione** va riservata **agli oliveti più freschi e umidi** e a quelli con drupe di maggiore pezzatura o che hanno recuperato rapidamente turgore dopo le precipitazioni. **Dopo le piogge verificare e se è necessario ripristinare le coperture con farine di roccia** (caolino/zeoliti) sulle drupe se dilavate. Discorso **analogo per le esche proteiche adulticide**, che se dilavate andranno riapplicate rispettando le dosi di etichetta, gli intervalli di sicurezza e il numero massimo di trattamenti. Per quanto riguarda **invece la difesa ovo-larvicida, allo stato attuale, con catture ancora pari a zero e in assenza di evidenze di infestazione attiva, non si ritengono giustificati interventi generalizzati**. Eventuali trattamenti con **prodotti ovo-larvicidi** andranno effettuati al **superamento della soglia d'intervento** (3% d'infestazione attiva). Si raccomanda infine di **monitorare anche la presenza di margaronia**, soprattutto **su giovani impianti e vegetazione in accrescimento**, così come eventuali incrementi di cimice asiatica e cocciniglie. **In presenza di danni da grandine, intervenire con prodotti rameici entro le 48 ore successive all'evento**. Tale intervento è **volto a contenere il rischio di infezioni da rogna dell'olivo**.

CONSIGLI D'INTERVENTO

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata dalle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

AREALE LARIO

La **fase fenologica** rilevata in campo è quella **d'ingrossamento della polpa/inolizione**.

A seguito dei monitoraggi **si rileva** una certa **precocità nello sviluppo fenologico**. Infatti, alcune varietà precoci stanno già cominciando a virare il colore della drupa. Le condizioni attuali di temperatura ed umidità sono predisponenti per l'attacco di mosca. Al momento non si rilevano attacchi sensibili, se non su olive da mensa. Resta comunque **opportuno effettuare monitoraggi settimanali raccogliendo casualmente un campione di 100 drupe per oliveto, identificando** quelle con punture, sezionandole e **ricercando uova, larve o pupe**, considerando che **ogni stadio giovanile vitale dell'insetto all'interno dell'oliva corrisponde a un punto percentuale di infestazione attiva**, e che in caso di **infestazioni superiori al 3%** con presenza di uova o larve di prima età, sarà **necessario valutare tempestivamente eventuali interventi con ovo larvicidi**.

SITUAZIONE FITOSANITARIA

Sospendere le irrigazioni di soccorso.

CONSIGLI AGRONOMICI

Nelle **attuali condizioni e alla luce dei** risultati dei **monitoraggi** si consiglia di **continuare con la difesa preventiva contro** mosca dell'olivo che può essere **attuata con repellenti come le polveri di roccia** (caolino, zeoliti) o **con tecniche adulticide di tipo attract & kill** (esche proteiche avvelenate). Si raccomanda inoltre di **monitorare i giovani oliveti per** la presenza di **margaronia**, i cui stadi larvali danneggiano i germogli; **in caso di infestazioni significative**, intervenire con **prodotti a base di *Bacillus thuringiensis***, acidificando correttamente l'acqua di soluzione. Per quanto riguarda gli **interventi ovo-larvicidi contro mosca**, questi **sono giustificati solo al superamento della soglia economica d'intervento** e vanno pianificati a seguito del campionamento delle drupe, seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta.

CONSIGLI D'INTERVENTO



Inizio invaiatura su varietà precoce -areale Lario



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

NOTIZIE ED EVENTI

BANDO APERTO

Si comunica che **la CCIAA di Brescia** ha emesso un **bando per i Contributi alle Imprese Agricole del settore olivicolo (AGEF 2603)**, le domande possono essere **presentate dal 17 marzo 2026 fino al 31 ottobre 2026**.
Si riporta il link alla pagina dedicata:

<https://www.bs.camcom.it/bandi-e-contributi/bandi-di-contributo-camerale/imprese-olivicole>

DEROGA DELTAMETRINA

Si comunica che Regione Lombardia ha autorizzato, per il 2026, un intervento all'anno con Deltametrina su olivo per il controllo di *Halyomorpha halys* (cimice asiatica). La deroga è valida su tutto il territorio regionale per le aziende che aderiscono a SQNPI, PAC (SRA01) o OCM. Rispettare obbligatoriamente le indicazioni di etichetta.

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco

A CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNA LA MOSCA DELL'OLIVO" IN ALLEGATO SI RIPIA LA LOCANDINA DELL'EVENTO



«Il programma strategico per l'olivicoltura del Parco Alto Garda Bresciano»

WORKSHOP: LA MOSCA DELL'OLIVO

Sabato 29 AGOSTO 2026 - Sala Civica Castellani - Via del Teatro, 14 Gargnano

Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, *Bactrocera oleae*, il principale fitofago dell'olivicoltura, ha incrementato significativamente la sua capacità di arrecare danni nei nostri areali. L'attenuazione dei rigori invernali e l'incremento delle temperature favorevoli al suo sviluppo biologico hanno determinato un aggravio delle perdite produttive. In questo contesto, una conoscenza approfondita della biologia e del ciclo riproduttivo del fitofago diventa un presupposto imprescindibile per garantire la stabilità delle rese e l'eccellenza qualitativa dell'olio. *Nell'ambito del programma per l'olivicoltura dell'Alto Garda, è promosso un incontro tecnico con uscita in campo (workshop) al fine di approfondire tali argomenti.*

8:00 | Registrazione

08.30 – 09.30 | Parte in aula: lezione teorica
Morfologia dell'insetto;
Ciclo biologico, danni e soglie d'intervento;
Le strategie di difesa sia in convenzionale che in biologico, pratiche agronomiche utili al contenimento.

09:30 – 11:00 | Parte in campo: lezione pratica
Tecniche di monitoraggio e campionamento, controllo trappole e controllo punture;
Riconoscimento dell'insetto: adulti, ovature, stadi larvali;
Calcolo dell'infestazione attiva e scelta degli interventi di contenimento.

Relatori: Tecnici AIPOL – Moderatori: funzionari Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ufficio agricoltura.

Incontro aperto a tutti gli olivicoltori interessati.

Per conferma partecipazione ed informazioni: olivicultura@cm-parcoaltogarda.bs.it (parcheggio consigliato via Ruc, Gargnano)



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo

Iniziativa Cofinanziata e Patrocinata delle Camere di Commercio di Brescia, Bergamo e Como-Lecco:

PER GLI OLIVICOLTORI DEL SEBINO E A CHI FOSSE INTERESSATO SI SEGNA LA L'EVENTO:



Ieri-Oggi-Domani

**Momenti Raccontati dai Protagonisti dell'Associazione
"Gli Olivicoltori i Tecnici ed i Presidenti"**

Interventi	Paolo Bertazzoli
Sindaco	Silvestro Danesi
Vice Presidente	Laura Fenaroli, Valentino Ghirardelli
Presidenti	Matteo Ghilardi, Stefano Morina, Luigi Alberti
Tecnici	Livia Bonardi, Giorgio Dall'Olio, Fabrizio Bellini, Gigi Zenti, Gianni Ballini, Enrico Cuni
Associati veterani	Augusto Martinelli, Carlo Duci, Simone Cancelli, Denny Pauzzi, Marco Gamba
Associati novelli	Brindisi a sorpresa con gadget
Conclusioni	Marco Antonucci
Moderatore	100 Persone
Partecipanti	Libero e gratuito
Ingresso	silvestrodanesi61@gmail.com
Prenotazione	

Pomeriggio 15.00-16.00 **Degustazione di oli curata e guidata da Marco Antonucci**